

Headline	HIV In Malaysia		
MediaTitle	Oriental Daily News		
Date	02 Jul 2013	Color	Full Color
Section	News	Circulation	100,505
Page No	A12	Readership	127,000
Language	Chinese	ArticleSize	464 cm <sup>2</sup>
Journalist	N/A	AdValue	RM 7,424
Frequency	Daily	PR Value	RM 22,272



# 异性性行为主因 女爱滋病患激增

(吉隆坡1日讯) 大马爱滋病患者当中，男性约占9成，但女性的新病例近年急起直追，使得新病例的男女比例，从1992年的35:1，激增为2012年的4:1，「异性间性行为」也在2011年超越「注射毒品」，成为主要感染原因。

根据卫生部爱滋病及性传染疾病部门统计，1992年每年新病例当中，有2443名男性，女性则有69名，女患者在1997年为197人，2002年攀升至629人，2006年更高达875人。

统计显示，有关比例在2002年为10:1，2005年为7:1，2007年降至5:1；2012年共有2704名男性新病例及734名女性新病例，比例约为4:1。

此外，我国爱滋病患者向来是因为注射毒品时共用针筒染病，但在政府推行减少危害计划、美沙酮疗法以及针筒替换计划后，有关比例有所下降。

## 近万女性新病例

根据大马爱滋病病例概况报告显示，2010年时因注射毒品感染的新病例为1737人，2011年时减至1348人，2012年再减至1014人；但因异性间性行为感染的新病例，则分别为1472人、1573人及1538人。

国人虽对爱滋病抱有「同性恋性关系导致染病」的刻板印象，但从该3年仅有301、358及654个因同性恋或双性恋染病的新病例，有关说法不攻自破，异性性行为已成为我国爱滋病患者最主要的染病原因。

另一方面，根据《第7届爱滋病病理、治疗及预防研讨会》大马情况报告，大马爱滋病患者总数当中，男性约占90%，其中有48%是因为注射毒品感染，另有47%是透过性交感染。

我国从1986年到2011年杪，共有9494名女性新病例，其中45%

是在2005年至2011年这7年期间增加的新病例。

虽然性工作者在所有患者当中的比例不高，在全国的9万4841个病例当中只有611人，仅占0.6%，但那可能是因为有关群体的漏报。

## 病患易染肺结核

有关报告指出，「性工作者不会轻易让他人知道他们的身份，可能也不会挺身治疗。目前调查只包括女性及变性的性工作者，而男性性工作者也难以侦测，这导致他们被排除在现有治疗及预防计划之外。」

报告也指出，由于爱滋病病毒感染者免疫力下降，他们特别容

大马爱滋病患者总数当中，男性约占90%，其中有48%是因为注射毒品感染，另有47%是透过性交感染。

大马情况报告

易感染肺结核。

大马在1990年至2011年的爱滋病/肺结核感染案例从6个增至1630个。

为了降低爱滋病、肺结核的共同感染案例，政府已在2011年开始为患者进行抗结核的预防性投药 (Isoniazid Prophylaxis)。



第7届爱滋病病理、预防及治疗研讨会联合主席阿娣巴卡鲁扎曼 (左) 与世界卫生组织爱滋病组主任葛菲欣沙在记者会上，推介《抗反转录病毒药物的爱滋病治疗指南》。

Headline	HIV In Malaysia		
MediaTitle	Oriental Daily News		
Date	02 Jul 2013	Color	Full Color
Section	News	Circulation	100,505
Page No	A12	Readership	127,000
Language	Chinese	ArticleSize	464 cm <sup>2</sup>
Journalist	N/A	AdValue	RM 7,424
Frequency	Daily	PR Value	RM 22,272

